

Total number of pages – 32

CODE : 35T MATH (EN/AS/BN/BD)

2025

MATHEMATICS

Full Marks : 100

Pass Marks : 30

Time : Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Q. No. 1 (a-l) carries 1 mark each (any ten) $1 \times 10 = 10$

Q. Nos. 2-13 carry 4 marks each..... $4 \times 12 = 48$

Q. Nos. 14-20 carry 6 marks each..... $6 \times 7 = 42$

Total = 100

1. Answer the following questions : (any ten)

1×10=10

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া : (যিকোনো দহটা)

নীচৰ প্ৰশ্নগুলিৰ উত্তৰ দাও : (যে-কোনো দশটি)

गाहायनि सौनायफोरनि फिननाय हो : (जायखिजाया मोनजि)

(a) Find the number of all one-one functions from set $A = \{1, 2, 3\}$ to $B = \{a, b, c\}$.

সংহতি $A = \{1, 2, 3\}$ ৰ পৰা $B = \{a, b, c\}$ লৈ মুঠ কিমানটা একৈকী ফলন আছে?

সংহতি $A = \{1, 2, 3\}$ -এৰ মध्ये $B = \{a, b, c\}$ -তে মোট কতগুলি একৈকী অপেক্ষক আছে।

থুবুৰ $A = \{1, 2, 3\}$ নিফ্রায় $B = \{a, b, c\}$ সিম গাসৈ বেसेबां गुदिफा मावथुन दं ?

(b) Find the principal value of $\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$.

$\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ ৰ মুখ্য মান নির্ণয় কৰা।

$\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ -এৰ মুখ্য মান নির্ণয় কৰো।

$\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$ নি गाहाइ मान दिहुन।

- (c) Let A , B and C are matrices of order $2 \times n$, 3×2 and $2 \times k$ respectively. Then $AB + CB$ will be defined for what values of n and k ?

ধরা হ'ল A , B আৰু C যথাক্রমে $2 \times n$, 3×2 আৰু $2 \times k$ ঘাতৰ মৌলিকম্ফ। তেন্তে $AB + CB$ মৌলিকম্ফটো n আৰু k ৰ কি মানৰ কাৰণে সংজ্ঞাবদ্ধ হ'ব?

ধরা হ'ল A , B এবং C যথাক্রমে $2 \times n$, 3×2 এবং $2 \times k$ ঘাতের মৌলিকম্ফ। তাহলে $AB + CB$ মৌলিকম্ফটি n এবং k -এর কোন মানের জন্য সংজ্ঞাবদ্ধ হবে?

হমৰায় A , B আৰু C ফাৰিয়ে $2 \times n$, 3×2 আৰু $2 \times k$ ফাৰিনি থোঁসাজায়। অল্লা $AB + CB$ থোঁসাজায়া n আৰু k নি মা মাননি থাখায় বুংফোৰথিয়াৰি জাগোন?

- (d) State True or False :

Let R be the relation in the set $\{1, 2, 3, 4\}$, given by

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}.$$

Then R is reflexive but not symmetric.

শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা :

$\{1, 2, 3, 4\}$ সংহতিত সংজ্ঞাবদ্ধ সম্বন্ধ R এনেদৰে দিয়া আছে,

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}।$$

তেন্তে R প্রতিফলনীয়, কিন্তু প্রতিসম নহয়।

শুদ্ধ না অশুদ্ধ লেখো :

$\{1, 2, 3, 4\}$ সংহতিতে সংজ্ঞাবদ্ধ সম্বন্ধ R এমনভাবে দেওয়া আছে যে —

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}।$$

তাহলে R প্রতিফলনীয়, কিন্তু প্রতিসম নয়।

থার এৰা নংখায় লিৰ :

$\{1, 2, 3, 4\}$ থুবুৰআব বুংফোরথিয়ারি সোমোন্দো R এরৈবাতি হোনায দং,

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3)\}$$

অব্লা R আ রিফিখাং, নাথায় ফারিগ্ৰোব নডা।

(e) Differentiate e^{x^2+1} with respect to x .

e^{x^2+1} ৰ x সাপেক্ষে অৱকলজ উলিওৱা।

e^{x^2+1} -এৰ x সাপেক্ষে অবকলজ নির্ণয় কৰো।

e^{x^2+1} নি x লোব্বায়াব সানখি দিহুন।

(f) $\int e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = ?$

(g) Determine the order of the differential equation

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x.$$

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x \text{ অৱকল সমীকৰণৰ ক্ৰম নিৰ্ণয় কৰা।}$$

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x \text{ অবকল সমীকরণের ক্রম নির্ণয় কৰো।}$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + 3x \frac{d^2y}{dx^2} = \sin x \text{ সানখি সমানথাইনি ফারি दिहुन।}$$

(h) For what values of θ , $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$, where θ be the angle between the vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$?

θ ৰ কি মানৰ কাৰণে $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ হয়, য'ত θ হৈছে ভেক্টৰ $\vec{a}$ আৰু $\vec{b}$ ৰ মাজৰ কোণ ?

θ -এৰ কোন মানৰ জন্য $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ হয়, যেখানে θ হল ভেক্টৰ $\vec{a}$ এবং $\vec{b}$ -এৰ মধ্যবর্তী কোণ ?

θ নি মা মাননি থাখায়নো $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ জায়ো, জেরাব θ আ জাদোঁ ভেক্টর $\vec{a}$ আরো $\vec{b}$ নি গেজেরনি খনা ?

(i) A homogeneous differential equation of the form $\frac{dx}{dy} = h\left(\frac{x}{y}\right)$ can be solved by making the substitution—

(A) $y = vx$

(B) $v = yx$

(C) $x = vy$

(D) $x = v$

$\frac{dx}{dy} = h \left(\frac{x}{y} \right)$ আকাৰৰ সমমাত্ৰিক অবকল সমীকৰণ সমাধানৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠাপন সূত্ৰটো

হ'ল—

(A) $y = vx$

(B) $v = yx$

(C) $x = vy$

(D) $x = v$

$\frac{dx}{dy} = h \left(\frac{x}{y} \right)$ আকাৰৰ সমমাত্ৰিক অবকল সমীকৰণ সমাধানৰ জন্ম প্ৰতিষ্ঠাপন সূত্ৰটি

হ'ল—

(A) $y = vx$

(B) $v = yx$

(C) $x = vy$

(D) $x = v$

$\frac{dx}{dy} = h \left(\frac{x}{y} \right)$ ম'হৰনি ফ'লেৱলি সানখি সমানথাই। মাৱফুথাইনি থাখায় ফজ'স্তায়নায

মাৱসুলুআ জাৰায় —

(A) $y = vx$

(B) $v = yx$

(C) $x = vy$

(D) $x = v$

(j) Find the determinant of the matrix $A = [-3]_{1 \times 1}$.

$A = [-3]_{1 \times 1}$ মৌলকক্ষৰ নিৰ্ণায়ক উলিওৱা।

$A = [-3]_{1 \times 1}$ মৌলকক্ষৰ নিৰ্ণায়ক বের কৰো।

$A = [-3]_{1 \times 1}$ থোঁসাজায়নি দিহুনলি দিহুন।

(k) State True **or** False :

$\sin x + 100$ is an antiderivative of $\cos x$.

শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা :

$\sin x + 100$ টো $\cos x$ ৰ এটা প্রতি-অৱকলজ।

শুদ্ধ না অশুদ্ধ লেখো :

$\sin x + 100$ হল $\cos x$ -এৰ একটি অ্যান্টি-ডেৰিভেটিভ।।

থার एबा नंखाय लिर :

$\sin x + 100$ আ $\cos x$ নি মোনসে সোলায়খি উল্খা।

(l) Find the direction ratios of the line segment joining the points $(-2, 4, -5)$ and $(1, 2, 3)$.

$(-2, 4, -5)$ আৰু $(1, 2, 3)$ বিন্দু সংযোগী ৰেখাডালৰ দিশানুপাত উলিওৱা।

$(-2, 4, -5)$ এবং $(1, 2, 3)$ বিন্দু-সংযোগকাৰী ৰেখাটিৰ দিশানুপাত নিৰ্ণয় কৰো।

$(-2, 4, -5)$ আৰু $(1, 2, 3)$ বিন্দু ফোনাঁজাৰনায় হাংখোনি রুজুজখা থিংজায় দিহুন।

2. Find the simplest form of the function

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0.$$

4

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0 \text{ ফলনটো সৰলতম আকাৰত প্রকাশ কৰা।}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0 \text{ অপেক্ষকটিকে সৰলতম আকাৰে প্রকাশ কৰো।}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right), x \neq 0 \text{ মাবথুনখৌ গোরলৈসিন মহরাব ফোৰমায়।}$$

OR / নাইবা / অথবা / এন্ড

$$\text{Find the value of } \tan^{-1}\left(2\sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right).$$

4

$$\tan^{-1}\left(2\sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right) \text{ ৰ মান উলিওৱা।}$$

$$\tan^{-1}\left(2\sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right) \text{ -এৰ মান নির্ণয় কৰো।}$$

$$\tan^{-1}\left(2\sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)\right) \text{ নি মান दिह्नु।}$$

3. Answer (i) and (ii) **or** (a) and (b):

উত্তৰ কৰা (i) আৰু (ii) অথবা (a) আৰু (b):

উত্তৰ দাও (i) এবং (ii) অথবা (a) এবং (b):

ফিননায় লিৰ (i) আরো (ii) এৰা (a) আরো (b):

(i) If $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, find A^2 . 1

যদি $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, উলিওৱা A^2 :

যদি $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ হয়, তাহলে A^2 -এৰ মান নিৰ্ণয় কৰো।

জুদি $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, দিহুন A^2 .

(ii) If $A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, where A' is the transpose of A , then find $(A + 3B)'$. 3

যদি $A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ আৰু $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, য'ত A' টো A ৰ পক্ষান্তৰিত মৌলকক্ষ, তেন্তে $(A + 3B)'$ উলিওৱা।

যদি $A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, যেখানে A' টি A -এৰ পক্ষান্তৰিত মৌলকক্ষ, তাহলে $(A + 3B)'$ নিৰ্ণয় কৰো।

জুদি $A' = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ আরো $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, জেৰাব A' আ A নি দোনস্লায়থাই থোঁসাজায়, অল্লা $(A + 3B)'$ দিহুন।

OR / নাইবা / অথবা / एवा

- (a) Give an example of a skew-symmetric matrix. 1

বিষম-সমমিত মৌলকক্ষ এটাৰ উদাহৰণ দিয়া।

একটি বিষম-সমমিত মৌলকক্ষৰ উদাহৰণ দাও।

खैँस्लाय फारिग्रोब थोंसाजाय मोनसेनि बिदिन्थि हो।

- (b) If $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ and $A + A' = I$, where I is the identity matrix of order 2, then find the value of x . 3

যদি $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ আৰু $A + A' = I$, য'ত I হৈছে 2 ঘাতৰ অভেদ মৌলকক্ষ, তেন্তে x -ৰ মান উলিওৱা।

যদি $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ এবং $A + A' = I$, যেখানে I হল 2 ঘাতের অভেদ মৌলকক্ষ, তাহলে x -র মান নির্ণয় কৰো।

জुदि $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$ आरो $A + A' = I$, जेराव I आ जादों 2 फारिनि थाबिथा थोंसाजाय, अब्ला x -नि मान दिहुन।

4. (i) Using determinants find the equation of the line joining the points (1, 2) and (3, 6). 2

নিৰ্ণায়ক ব্যবহাৰ কৰি (1, 2) আৰু (3, 6) বিন্দু সংযোগী ৰেখাৰ সমীকৰণ উলিওৱা।

নিৰ্ণায়ক ব্যবহার করে (1, 2) এবং (3, 6) বিন্দু-সংযোগকারী রেখার সমীকরণ নির্ণয় কৰো।

दिहुनलि बाहायनानै (1, 2) आरो (3, 6) बिन्दो फोनांजाब हांखोनि समानथाइ दिहुन।

- (ii) Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that $f(x) = \sin x$ and $g(x) = x^2$. Then find composition function $g \circ f$. 2

(here $\mathbb{R}$ = set of real numbers)

যদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যাতে $f(x) = \sin x$ আৰু $g(x) = x^2$, তেন্তে সংযোজন ফলন $g \circ f$ উলিওৱা। (ইয়াত $\mathbb{R}$ = বাস্তৱ সংখ্যাৰ সংহতি)

যদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ এমন যে $f(x) = \sin x$ এবং $g(x) = x^2$, তাহলে সংযোজন অপেক্ষক $g \circ f$ নির্ণয় কৰো। (এখানে $\mathbb{R}$ = বাস্তৱ সংখ্যাৰ সংহতি)

জুদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ জাহাথে $f(x) = \sin x$ আরো $g(x) = x^2$, অল্লা জথায় মাৱথুন $g \circ f$ দিহুন। (বেয়াব $\mathbb{R}$ = নংগুৰৈ অনজিমানি থুবুৰ)

5. Find $\frac{dy}{dx}$, if 2+2=4

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

$\frac{dy}{dx}$ উলিওৱা, যদি

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

$\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কৰো, যদি

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

$\frac{dy}{dx}$ दिहून, जुदि

(i) $x = t + \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

(ii) $x^y = y^x$

6. Find the intervals in which the function f given by $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ is

(a) increasing (b) decreasing 2+2=4

$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ ब द्द्वारा निर्दिष्ट f फलनटो कोन अस्तुबानत

(a) वर्धमान

(b) ह्रासमान उलिओरा।

$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ द्वारा निर्दिष्ट f अपेक्षकटि कोन अस्तुराले

(a) वर्धमान एवं

(b) ह्रासमान निर्णय करो।

$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ नि जोहै थिखानाय f मावथुना मावे खोन्दोबाव

(a) बांलांमान

(b) खमायलांमान दिहून।

OR / নাইবা / অথবা / এবা

A balloon, which always remains spherical, has a variable diameter $(2x+1)$. Find the rate of change of its volume with respect to x .
4

এটা বেলুন সদায় গোলাকাৰ হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ পৰিবৰ্তনশীল ব্যাস $(2x+1)$ । x সাপেক্ষে ইয়াৰ আয়তনৰ পৰিবৰ্তনৰ হাৰ উলিওৱা।

একটি বেলুন সৰ্বদা গোলাকাৰ হয়ে থাকে এবং এর পৰিবৰ্তনশীল ব্যাস $(2x+1)$ । x -এৰ সাপেক্ষে এর আয়তনৰ পৰিবৰ্তনৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰো।

থোৰসে বেলুনা জেব্বাৰো তুলুৱ মহৰ জানানৈ থায়ো আরো বেনি সোলায়স্তু খাৰা $(2x+1)$ । x নি লোব্বায়াব বেনি রোজাগাসৈনি সোলায়নাযনি হাৰ দিহুন।

7. Evaluate : (*any two*)

2+2=4

(i) $\int \log x dx$

(ii) $\int \sin^2 x dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} dx$

মান নিৰ্ণয় কৰা : (যিকোনো দুটা)

(i) $\int \log x dx$

(ii) $\int \sin^2 x dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} dx$

মান নিৰ্ণয় কৰো : (যে-কোনো দুটি)

(i) $\int \log x dx$

(ii) $\int \sin^2 x dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} dx$

মান দিহুন : (জায়খিজায়া মোননৈ)

(i) $\int \log x \, dx$

(ii) $\int \sin^2 x \, dx$

(iii) $\int x\sqrt{3x+2} \, dx$

OR / নাহিবা / অথবা / এবা

Evaluate :

4

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} \, dx$$

মান নির্ণয় কৰা :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} \, dx$$

মান নির্ণয় করো :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} \, dx$$

মান দিহুন :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} \, dx \text{ kkk}$$

8. Find the area lying in the first quadrant and bounded by the circle $x^2 + y^2 = 1$ and the lines $x = 0$ and $x = 1$. 4

প্রথম চোকত বৃত্ত $x^2 + y^2 = 1$ আৰু সবলৰেখা $x = 0$ আৰু $x = 1$ য়ে আগুৰা ক্ষেত্ৰৰ কালি উলিওৱা।

প্রথম চতুৰ্থাংশ বৃত্ত $x^2 + y^2 = 1$ এবং সরলরেখা $x = 0$ এবং $x = 1$ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত ক্ষেত্ৰৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো।

গিৰি জখাইসৈয়াব বঁখন $x^2 + y^2 = 1$ আরো গোথোঁহাংখো $x = 0$ আরো $x = 1$ আ আবগিনায় দব্লাইনি দব্লাইথি দিহুন।

OR / নাইবা / অথবা / এৱা

Find the area of the region bounded by the line $y = 3x + 2$, the x -axis and ordinate $x = 1$. 4

$y = 3x + 2$ সবলৰেখা, x -অক্ষ আৰু $x = 1$ কোটিয়ে আগুৰা ক্ষেত্ৰৰ কালি উলিওৱা।

$y = 3x + 2$ সরলরেখা, x -অক্ষ এবং $x = 1$ কোটি দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত ক্ষেত্ৰৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো।

$y = 3x + 2$ গোথোঁহাংখো, x -বিথ' আরো $x = 1$ জানস'আ আবগিনায় দব্লাইনি দব্লাইথি দিহুন।

9. (i) Let $\vec{a}$ is a non-zero vector of magnitude 2 and λ is a non-zero scalar. Find the value of λ such that $\lambda\vec{a}$ is a unit vector. 2

$\vec{a}$ এটা 2 মানৰ অশূন্য ভেক্টৰ আৰু λ এটা অশূন্য স্কেলাৰ। λ ৰ কি মানৰ বাবে $\lambda\vec{a}$ এটা একক ভেক্টৰ হ'ব?

$\vec{a}$ একটি 2 মানের অশূন্য ভেক্টর এবং λ একটি অশূন্য স্কেলার। λ -এর কোন মানের জন্য $\lambda\vec{a}$ একটি একক ভেক্টর হবে?

$\vec{a}$ আ মোনসে 2 মাননি লাথিখ' নডি ভেক্টর আরো λ আ মোনসে লাথিখ' নডি স্কেলার। λ নি মা মাননি থাখায় $\lambda\vec{a}$ আ মোনসে সানগুদি ভেক্টর জাগোন?

(ii) Find the direction cosine of the vector $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$. 2

$\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ ভেক্টৰৰ দিশাংক উলিওৱা।

$\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ ভেক্টৰেৰ দিশাংক নিৰ্ণয় কৰো।

$\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ ভেক্টৰনি থোঁ কসাউন দিহুন।

10. If $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ are unit vectors such that $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, find the value of $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$. 4

যদি $\vec{a}$, $\vec{b}$ আৰু $\vec{c}$ একক ভেক্টৰ হয় যাতে $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, তেন্তে $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

যদি $\vec{a}$, $\vec{b}$ এবং $\vec{c}$ একক ভেক্টৰ হয় যাতে $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, তাহলে $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ -এৰ মান নিৰ্ণয় কৰো।

জুদি $\vec{a}$, $\vec{b}$ আৰু $\vec{c}$ সানগুদি ভেক্টৰ জাযো জাহাথে $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, অল্লা $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ নি মান দিহুন।

OR / নাইবা / অথবা / एबा

Find the area of a triangle having the points $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ and $C(2, 3, 1)$ as its vertices. 4

এটা ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু তিনিটা $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ আৰু $C(2, 3, 1)$ হ'লে, ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিওৱা।

একটি ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু তিনিটি $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ এবং $C(2, 3, 1)$ হলে, ত্ৰিভুজটিৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো।

মোনসে আখান্থিথামনি থিখিনি বিন্দো মোনথামা $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ আৰু $C(2, 3, 1)$ জাযোল্লা আখান্থিথামনি দল্লাইথি দিহুন।

11. (i) Find a vector of magnitude 5 units in the direction of the vector $\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$. 2

$\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ ভেক্টৰৰ দিশত এনে এটা ভেক্টৰ উলিওৱা যাৰ মান 5 একক।

$\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ ভেক্টৰৰ দিশায় এমন একটি ভেক্টৰ নিৰ্ণয় কৰো যাৰ মান 5 একক।

$\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ ভেক্টৰনি দিগাব ঐৰূপে মনসে ভেক্টৰ দিহুন জায়নি মানা 5 সানগুদি।

- (ii) Find the projection of the vector $\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ on the vector $7\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$. 2

$7\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$ ভেক্টৰত $\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ ভেক্টৰৰ অভিক্ষেপ নিৰ্ণয় কৰা।

$7\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$ ভেক্টৰৰ উপৰে $\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ ভেক্টৰৰ অভিক্ষেপ বের কৰো।

$7\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$ ভেক্টৰত $\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ ভেক্টৰনি থোঁখানায় দিহুন।

12. (i) A coin is tossed three times. Find the probability of occurring head on the third toss. 2

একটা মুদ্রা তিনিবাৰ টছ কৰা হ'ল। তৃতীয় টছত মুণ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলিওৱা।

একটি মুদ্রা তিনবাৰ টস্ কৰা হল। তৃতীয় টসটিতে মুণ্ড হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কৰো।

গৰসে খাউরি থামখেৰ গাৰহৰনায় জাৰায়। থামখি খেৰ গাৰহৰনায়াব খৰ' মননায়নি জাথাবনা দিহুন।

- (ii) Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both cards are spade. 2

52 পতীয়া তাচখেলাৰ থাক এটিৰ পৰা পুনৰ্স্থাপন নকৰাকৈ (without replacement) দুখন পাত যাদৃচ্ছিকভাৱে টনা হ'ল। দুয়োখন পাত ইস্কাপন (spade) হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা।

52 টি কাৰ্ড সমেত একটি তাৰে প্যাকেট থেকৈ কোনোৱকম বদল না কৰে দুটি কাৰ্ড এলোমেলোভাৱে টনা হ'ল। উভয় কাৰ্ডেৰ স্পেড (ইস্কাপন) হওৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰো।

গাং 52 বিলাই থানায় জাৰসে তাস বিলাইনিফ্ৰায় জেবো সোলায়া লাসিনো গানৈ বিলাই সাযজ্জল'জানায় ৰাদিযৈ বোনায জাৰায়। গানৈবো বিলাইয়া ইস্কাপন জানায়নি জাথাবনা দিহুন।

13. A man is known to speak truth 4 out of 5 times. He throws a die and reports that it is three. Find the probability that it is actually three. 4

এজন মানুহে 5 বাৰৰ ভিতৰত 4 বাৰ সঁচা কথা কয় বুলি জনা যায়। তেওঁ পাশতি এটা টছ কৰে আৰু তিনি পোৱা বুলি ব্যক্ত কৰে। পাশতিটোত সচাকৈয়ে তিনি পোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা।

একজন মানুহ 5 বাৰেৰে মध्ये 4 বাৰ সত্য কথা বলে বলে জানা যায়। তিনি একটি পাশা টস্ক করেন এবং 'তিনি' পেয়েছেন বলে জানান। পাশাটিতে সত্যি করে 'তিনি' পাওয়ার সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰো।

সাৰে মানসিয়া 5 খেৰনি মাদাব 4 খেৰ সঁথো ৰাথ্ৰা বুডো হোননা মিথিয়ো। ৰিয়ো ডাইস গৰসে টস খালামো আৰো থাম মোনৰায় হোননা ফোৰমায়ো। ডাইসআব থাৰৈনো থাম মোনৰায়নি জাথাবনা দিহুন।

OR / নাইবা / অথবা / এৰা

A fair coin and an unbiased die are tossed. Let A be the event 'head appears on the coin' and B be the event '3 on the die'. Check whether A and B are independent events or not. 4

এটা নিখুঁত মুদ্ৰা আৰু এটা অবিকৃত পাশতি একেলগে টছ কৰা হ'ল। 'মুদ্ৰাটোত মুণ্ড পোৱা ঘটনা'ক A আৰু 'পাশতিটোত 3 পোৱা ঘটনা'ক B ৰে সূচালে, A আৰু B স্বতন্ত্ৰ হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা।

একটা নিখুঁত মুদ্রা এবং একটি অবিকৃত পাশা একসঙ্গে টস্ করা হলো। 'মুদ্রাটিতে মুণ্ড পাওয়া ঘটনা'-কে A এবং 'পাশাটিতে ৩ পাওয়ার ঘটনা'-কে B সূচিত করে। A এবং B স্বতন্ত্র কিনা পরীক্ষা করো।

গরসে স্লিমস্লিম খাউরি আরো গরসে রাবনিবো ফারসে জাযি ডাইস জয়ৈ গারহরনায় জাৰায়। 'খাউরিয়াব খর' মোননায় জাথাইখৌ A আরো 'ডাইসআব ৩ মোননায় জাথাই'খৌ B জৌ দিন্থিযোব্লা। A আরো B আ উদাং জাথাই জাযৌ না জাযা আনজাদ খালাম।

14. Answer (a) or (b) :

উত্তর কবা (a) আৰু (b) :

উত্তর দাও (a) অথবা (b) :

ফিননায় লির (a) এৰা (b) :

(a) (i) Find the minor and cofactor of the second row and second column element of the determinant 2

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$$

নির্ণায়কৰ দ্বিতীয় শাৰী আৰু দ্বিতীয় স্তম্ভ মৌলটোৰ অনুৰাশি

আৰু সহৰাশি উলিওৱা।

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$$

নির্ণায়কৰ দ্বিতীয় সারি এবং দ্বিতীয় স্তম্ভ মৌলটির অনুৰাশি

এবং সহৰাশি নির্ণয় করো।

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$$
 দিহুনলিনি নৈথি লারি আরো নৈথি খাম্ফা গুদিথা বাদিয়ৈ আরো
 লোগো লারি দিহুন।

(ii) For the matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, show that $A^2 - 5A + 7I = 0$.

Hence find A^{-1} , where I is the identity matrix of order 2. 4

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ মৌলকক্ষৰ বাবে দেখুওৱা যে $A^2 - 5A + 7I = 0$ । ইয়াৰ
 পৰা A^{-1} উলিওৱা, য'ত I হৈছে 2 ঘাতৰ অভেদ মৌলকক্ষ।

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ মৌলকক্ষৰ ক্ষেত্ৰে দেখাও যে $A^2 - 5A + 7I = 0$ । এৰ
 থেকে A^{-1} নিৰ্ণয় কৰো, যেখানে I হল 2 ঘাতৰ অভেদ মৌলকক্ষ।

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ থোঁসাজায়নি থাখায় দিখিদি $A^2 - 5A + 7I = 0$ । বেনিফ্রায়
 A^{-1} দিহুন, জেৰাব I আ জাদোঁ 2 ফারিনি থাৰিথা থোঁসাজায়।

OR / নাইবা / অথবা / एवा

(b) Solve the linear system : (using matrix method)

6

$$x + y + z = 6$$

$$y + 3z = 11$$

$$x - 2y + z = 0$$

বৈখিক প্ৰণালীটো সমাধান কৰা : (মৌলকক্ষীয় পদ্ধতিৰে)

$$x + y + z = 6$$

$$y + 3z = 11$$

$$x - 2y + z = 0$$

রৈখিক প্রণালীটি সমাধান করো : (মৌলকক্ষীয় পদ্ধতি দ্বারা)

$$x + y + z = 6$$

$$y + 3z = 11$$

$$x - 2y + z = 0$$

হাঁখোআরি বিখান্থিখৌ মাওফুঁথাই দিহুন : (থোঁসাজাযারি আদবজোঁ)

$$x + y + z = 6$$

$$y + 3z = 11$$

$$x - 2y + z = 0$$

15. Answer (i) and (ii) **or** (a) and (b):

উত্তৰ কৰা (i) আৰু (ii) অথবা (a) আৰু (b) :

উত্তৰ দাও (i) এবং (ii) অথবা (a) এবং (b) :

ফিননায লির (i) আরো (ii) এন্না (a) আরো (b) :

(i) Find all points of discontinuity of the function f defined by

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{if } x < 1 \\ 0, & \text{if } x = 1 \\ x-2, & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

3

f ফলনৰ বিচ্ছিন্নতাৰ সকলো বিন্দু উলিওৱা য়ত

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{যদি } x < 1 \\ 0, & \text{যদি } x = 1 \\ x-2, & \text{যদি } x > 1 \end{cases}$$

[21]

Contd.

f অপেক্ষকের বিচ্ছিন্নতার সকল বিন্দু নির্ণয় করো যেখানে

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{যদি } x < 1 \\ 0, & \text{যদি } x = 1 \\ x-2, & \text{যদি } x > 1 \end{cases}$$

f মাবথুননি আন্থোর জনায় গাসেঁবো বিন্দোখৌ দিহুন জেরাব

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{জুদি } x < 1 \\ 0, & \text{জুদি } x = 1 \\ x-2, & \text{জুদি } x > 1 \end{cases}$$

(ii) If $\cos y = x \cos(a+y)$, with $\cos a \neq \pm 1$, prove that

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a+y)}{\sin a}.$$

3

যদি $\cos y = x \cos(a+y)$, $\cos a \neq \pm 1$, প্রমাণ করা যে,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a+y)}{\sin a}.$$

যদি $\cos y = x \cos(a+y)$, $\cos a \neq \pm 1$, প্রমাণ করো যে,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a+y)}{\sin a}.$$

জুদি $\cos y = x \cos(a+y)$, $\cos a \neq \pm 1$, ফোরমান খালাম দি,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a+y)}{\sin a}.$$

OR / নাইবা / অথবা / एबा

(a) If $y = \sin^{-1} x$, then show that $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} = 0$. 3

যদি $y = \sin^{-1} x$ হয়, তেঁতে দেখুওরা যে $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} = 0$ ।

যদি $y = \sin^{-1} x$ হয়, তাহলে দেখাও যে $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} = 0$ ।

জুদি $y = \sin^{-1} x$ জাযো, অল্লা দিখি দি $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} = 0$ ।

(b) Given $f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{if } x \leq 3 \\ x+4, & \text{if } x > 3 \end{cases}$

If the function f is continuous at $x=3$, find the value of a . 3

দিয়া আছে $f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{যদি } x \leq 3 \\ x+4, & \text{যদি } x > 3 \end{cases}$

যদি f ফলনটো $x=3$ বিন্দুত অবিচ্ছিন্ন হয়, তেঁতে a র মান নির্ণয় করা।

দেওয়া আছে $f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{যদি } x \leq 3 \\ x+4, & \text{যদি } x > 3 \end{cases}$

যদি f ফলনটি $x=3$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে a -এর মান নির্ণয় করো।

$$\text{होनाय दं } f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{जुदि } x \leq 3 \\ x+4, & \text{जुदि } x > 3 \end{cases}$$

जुदि f मावथुनआ $x=3$ बिन्दोआव आन्थोजयि जायो, अब्ला a नि मान दिहुन।

16. Find absolute maximum value and absolute minimum value of the function given by

$$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1, \quad x \in [1, 5]. \quad 6$$

$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ ब द्वारा निर्दिष्ट f फलनटोब $[1, 5]$ अन्तरालत परम गरिष्ठ आरु परम लघिष्ठ मान उलिओरा।

$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ -एर द्वारा निर्दिष्ट f अपेक्षकटि $[1, 5]$ अन्तराले परम गरिष्ठ एवं परम लघिष्ठ मान निर्णय करो।

$f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ नि जोहै थि f मावथुननि $[1, 5]$ आन्थोराव बांसिनथा देरमा आरो हायसिनथा देरमा मान दिहुन।

OR / नाइवा / अथवा / एबा

Find the point(s) on the curve $x^2 = 2y$ which is nearest to the point $(0, 3)$. 6

$(0, 3)$ बिन्दुटोब परा निम्नतम दूरहत्त $x^2 = 2y$ बक्रटोब ओपबत थका बिन्दु/बिन्दुबोब उलिओरा।

$(0, 3)$ बिन्दुटि थेके निम्नतम दूरहत्ते $x^2 = 2y$ बक्रटि ओपरे अवस्थित बिन्दु/बिन्दुगुलि निर्णय करो।

$(0, 3)$ बिन्दोनिफ्राय खाथिसिन जानथाइयाव $x^2 = 2y$ बोहांओनि सायाव थानाय बिन्दो/बिन्दोफोरखौ दिहुन।

17. Evaluate : (any one)

6

$$(i) \int \sqrt{\tan x} \, dx$$

$$(ii) \int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} \, dx$$

মান নির্ণয় করা : (যিকোনো এটা)

$$(i) \int \sqrt{\tan x} \, dx$$

$$(ii) \int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} \, dx$$

মান নির্ণয় করো : (যে-কোনো একটি)

$$(i) \int \sqrt{\tan x} \, dx$$

$$(ii) \int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} \, dx$$

मान दिहून : (जायखिजाया मोनसे)

$$(i) \int \sqrt{\tan x} \, dx$$

$$(ii) \int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} \, dx$$

18. Solve the following differential equations : (any two) 3+3=6

(i) $x(x-1)\frac{dy}{dx} = 1, \quad y(-1) = 0$

(ii) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$

(iii) $(x-y)dy - (x+y)dx = 0$

তলৰ অৱকল সমীকৰণকেইটা সমাধান কৰা : (যিকোনো দুটা)

(i) $x(x-1)\frac{dy}{dx} = 1, \quad y(-1) = 0$

(ii) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$

(iii) $(x-y)dy - (x+y)dx = 0$

নীচৰ অৱকল সমীকৰণগুলি সমাধান কৰো : (যে-কোনো দুটি)

(i) $x(x-1)\frac{dy}{dx} = 1, \quad y(-1) = 0$

(ii) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$

(iii) $(x-y)dy - (x+y)dx = 0$

गाहायनि सानखि समानथाइफोरखौ मावफुंथाइ खालाम : (जायखिजाया मोननै)

$$(i) \quad x(x-1)\frac{dy}{dx} = 1, \quad y(-1) = 0$$

$$(ii) \quad \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$$

$$(iii) \quad (x-y)dy - (x+y)dx = 0$$

19. Answer (a) or (b) :

উত্তৰ কৰা (a) আৰু (b) :

উত্তৰ দাও (a) অথবা (b) :

ফিননায লিৰ (a) এৰা (b) :

(a) (i) If the lines

$$\frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2} \quad \text{and} \quad \frac{x-1}{3k} = \frac{y-1}{1} = \frac{6-z}{5}$$

are perpendicular, find the value of k .

3

যদি $\frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2}$ রেখাডাল $\frac{x-1}{3k} = \frac{y-1}{1} = \frac{6-z}{5}$ রেখাডালৰ লম্ব হয়, k ৰ মান উলিওৱা।

যদি $\frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2}$ রেখাটি $\frac{x-1}{3k} = \frac{y-1}{1} = \frac{6-z}{5}$ রেখাটিৰ লম্ব হয়, k -এৰ মান নিৰ্ণয় কৰো।

যদি $\frac{1-x}{3} = \frac{y-2}{2k} = \frac{z-3}{2}$ হাঁখোআ $\frac{x-1}{3k} = \frac{y-1}{1} = \frac{6-z}{5}$ হাঁখোনি থোঁগোৱা জাযো, অল্লা k নি মান দিহুন।

- (ii) Find the Cartesian equation of the line through the point $(5, 2, -4)$ and which is parallel to the vector $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$.

3

$(5, 2, -4)$ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ ভেক্টৰৰ সমান্তৰাল ৰেখাডালৰ কাৰ্টেজীয় সমীকৰণ উলিওৱা।

$(5, 2, -4)$ বিন্দুৰ মধ্য দিয়ে অতিক্ৰান্ত $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ ভেক্টৰৰ সমান্তৰাল ৰেখাটিৰ কাৰ্টেজীয় সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰো।

$(5, 2, -4)$ বিন্দোনী গেজেরজী থানায $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ ভেক্টরনি লিগ হাংখোনি কাৰ্টেজিয় (সমানথালারি) সমানথাই দিহুন।

OR / নাহিবা / অথবা / এবা

- (b) Find the shortest distance between the lines

$$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2} \text{ and } \frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}. \quad 6$$

$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2}$ আৰু $\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}$ ৰেখা দুডালৰ মাজৰ ন্যূনতম দূৰত্ব উলিওৱা।

$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2}$ এবং $\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}$ রেখা দুটিৰ মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰো।

$\frac{x-1}{1} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-3}{2}$ আরো $\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-6}{1}$ হাংখো দোঁনৈনি গেজেরনি সুঁসিন জানথাই দিহুন।

20. Solve graphically the following linear programming problems :

Maximize and minimize $Z = 3x + 5y$

subject to the constraints

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

6

$Z = 3x + 5y$ ৰ সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন মান উলিওৱা

য'ত

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

$Z = 3x + 5y$ -এৰ সৰ্বোচ্চ এবং সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ণয় কৰো

যেখানে

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

$Z = 3x + 5y$ নি বাঁসিনথা আরো हायसिनथा मान दिहुन

जेराव

$$2x + 3y \leq 36$$

$$x + y \leq 15$$

$$y \geq 3$$

$$x \geq 0$$

OR / নাহিবা / অথবা / এবা

Determine graphically the minimum value of the
objective function $Z = 3x + 9y$
subject to the constraints

$$x + 3y \leq 60$$

$$x + y \geq 10$$

$$x \leq y$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

6

উদ্দিষ্ট ফলন

$Z = 3x + 9y$ ৰ সৰ্বনিম্ন মান উলিওৱা, য'ত x আৰু y ৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ হ'ল

$$x + 3y \leq 60$$

$$x + y \geq 10$$

$$x \leq y$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

উদ্দিষ্ট অপেক্ষক

$Z = 3x + 9y$ -এৰ সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ণয় কৰো, যেখানে x এবং y -এৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ
হ'ল

$$x + 3y \leq 60$$

$$x + y \geq 10$$

$$x \leq y$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

हायसिनथा मान दिहुन, जेराव x आरो y नि हेंथायफोरा जाबाय —

— x —